

MR-scanning med kontrast

I forbindelse med MR-scanningen får du sprøjtet et kontraststof ind i en blodåre i armen.

Hvis en eller flere af nedenstående udsagn gør sig gældende for dig, må vi kun give dig kontrast, hvis vi er sikre på, at dine nyrer fungerer normalt. Det kan vi se ved hjælp af en blodprøve kaldet Serum-Kreatinin.

- Du er over 64 år
- Har forhøjet blodtryk
- Har sukkersyge
- Har urinsyreigt
- Har en nyresygdom

Er en eller flere af disse udsagn gældende for dig, skal du have taget en blodprøve (Serum-Kreatinin) inden undersøgelsen.

Vi har lagt en elektronisk henvisning på blodprøven ud på serveren, så ethvert blodprøve-laboratorium eller hospital kan se henvisningen, og tage blodprøven (dog ikke Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt laboratoriet i Vester Farimagsgade).

Husk at bestille tid til blodprøvetagning i det laboratorium, du vælger at benytte. Du skal få taget blodprøven senest 2-3 dage før undersøgelsesdagen.

Det er vigtigt at vi har svaret på blodprøven inden MR-scanningen, ellers kan vi ikke gennemføre undersøgelsen.

Hvis du er i tvivl eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.