

MR-scanning af tyndtarmen

I forbindelse med MR-scanningen får du sprøjtet et kontraststof ind i en blodåre i armen.

Forberedelse

Blodprøve

Hvis en eller flere af nedenstående udsagn gør sig gældende for dig, må vi kun give dig kontrast, hvis vi er sikre på, at dine nyrer fungerer normalt. Det kan vi se ved hjælp af en blodprøve kaldet Serum-Kreatinin.

- Du er over 64 år
- Har sukkersyge
- Har en nyresygdom

KUN hvis en eller flere af disse udsagn gælder for dig, skal du have taget en blodprøve inden scanningen. Vi har lagt en elektronisk henvisning på blodprøven ud på serveren, så ethvert blodprøve-laboratorium eller hospital kan se henvisningen, og tage blodprøven (dog ikke Bispebjerg og Frederiksberg Hospital samt laboratoriet i Vester Farimagsgade - KBH). Husk at bestille tid til blodprøvetagning i det laboratorium, du vælger at benytte.

Du **skal** få foretaget blodprøven 2-7 dage inden MR-scanningen. Har du fået fortaget en blodprøve indenfor 30 dage før MR-scanningen, kan vi benytte denne.

Det er vigtigt, at vi har svaret på blodprøven inden MR-scanningen, ellers kan vi ikke gennemføre undersøgelsen.

Faste

Du må ikke spise, ryge eller tygge tyggegummi 4 timer inden din scanning. Du må drikke vand indtil 2 timer før dit mødetidspunkt. Du må tage din vanlige medicin.

Mødetid

Du skal møde ind 1½ time FØR din tid til scanning, da du får udleveret mindst 1- 1,5 L kontrastvæske, som du skal drikke i løbet af tiden inde selve undersøgelsen. Du må gerne benytte toilettet, når du får trang til det.

Beroligende medicin

Lider du af klaustrofobi og har behov for beroligende medicin inden MR-scanningen, skal du kontakte henvisende læge med henblik på ordinerings af dette.

Vi har i Aleris desværre ikke mulighed for at udlevere beroligende medicin i forbindelse med MR-scanningen.

Efter undersøgelsen

Bilkørsel

Hvis du har fået beroligende medicin, må du ikke køre bil resten af dagen

Mad og drikke

Medbring gerne lidt mad, som du kan spise efter undersøgelsen. Resten af dagen skal du drikke ekstra væske.

Bivirkninger

I forbindelse med undersøgelsen får du en indsprøjtning med kontrast i en blodåre i armen, samt et middel, der får tarmene til at slappe af ganske kortvarigt, mens scanningen foretages. Det afslappende middel kan i sjældne tilfælde gøre, at synet bliver påvirket (sløret syn) – dette er helt ufarligt. Det kan vare i op til 2 timer, og det kan bevirke, at du ikke kan køre bil umiddelbart efter scanningen.

Læs mere om MR-scanninger, forholdsregler med mere i patientvejledningen "MR-scanning".