

# Jern behandling

## Direkte i blodbanen ved infusion

### Formål med behandlingen

Formålet med behandlingen er at behandle jernmangel og evt. samtidig blodmangel, hvor behandling med tabletter eller mikstur ikke har været tilstrækkelig.

### Forberedelse

Vi anbefaler, at du inden behandlingen har læst denne folder.

### Behandlingen

- Jernopløsningen er en mørkebrun væske, som blandes op i saltvand
- Du får lagt et lille plastikrør (venflon) i en blodåre på hånden eller på armen, hvor jernopløsningen bliver givet igennem
- Det tager ca. 30. minutter for væsken at løbe ind
- Efterfølgende skal du opholde dig i ventearealet i ca. 30 min i tilfælde af bivirkninger (i særdeleshed anafylaktisk reaktion)

### Efter undersøgelsen

#### Er der gener efter undersøgelsen?

Der kan være en smag af metal samt ømhed hvor dropet (venflon) har været lagt.

Der kan være lidt hovedpine og/eller svimmelhed.

### Bivirkninger

#### Sjældne

- Kvalme
- Opkastninger
- Mavesmerter
- Diarre
- Åndenød
- Hjerterbanken
- Hududslæt

#### Meget sjældne (mindre end 1 %)

- Smagsforstyrrelser
- Feber, lavt blodtryk, brystsmertter, rødmen, ødemer (hævelse)
- Føleforstyrrelser, muskel- og ledsmerter
- Anafylaktisk reaktion