



Kønsvorter

Kondylomer

Kønsvorter (kondylomer) er vortelignende udvækster i huden, som kan sidde ved kønsorganerne eller endetarmsåbningen. Kønsvorterne skyldes et virus (HPV), og de er meget smitsomme ved direkte kontakt. Derfor bør ens partner også undersøges for kønsvorter.


Kønsvorter / kondylomer er forholdsvis hyppige. Kønsvorter er hos kvinder typisk lokaliseret i skedeindgangen og omkring endetarmen. Hos mænd ses kønsvorterne desuden på forhuden og glans. Kønsvorter kan også forekomme i urinrøret.

Symptomer på kønsvorter / kondylomer

Ofte er der ingen symptomer på kønsvorter / kondylomer, men svie og kløe kan forekomme. Du vil ofte kunne fornemme uregelmæssigheder i huden. Derfor kan kønsvorter / kondylomer blive ret udbredte, inden de opdages.

Behandling af kønsvorter / kondylomer

Det er vigtigt, at kønsvorterne fjernes, dels fordi de smitter, dels fordi ubehandlede kønsvorter gennem lang tid kan udvikle sig til kræft.



Kønsvorter i endetarmsåbningen kan behandles på flere måder – enten med medicin som påsmøres direkte eller kirurgisk. Den kirurgiske behandling er den mest effektive. Den foregår ambulant i fuld bedøvelse. Som regel kan du efter kirurgisk behandling vende tilbage til arbejdet allerede næste dag.

Under alle omstændigheder anbefales jævnlige kontroller i en periode efter behandling af kønsvorter i endetarmsåbningen. Ofte vil det være nødvendigt med flere behandlinger, før alle områder med kønsvorter er behandlet, da de tidlige forandringer er for små til, at de kan ses, og man må derfor afvente til, de har tiltaget i størrelse.


Ens seksualpartner (-e) bør også undersøges for kønsvorter, da de

smitter ved direkte kontakt. Man bør undgå seksuel kontakt med personer, som har kønsvorter, indtil de er blevet behandlet.

Forundersøgelse

Du kommer først til en forundersøgelse hos vores speciallæge i mave-tarm kirurgi. Hvis det ved tidsbestillingen oplyses, at årsagen er gener omkring endetarmsåbningen, vil der i forbindelse med forundersøgelsen være planlagt en kikkertundersøgelse af endetarmen (rektoskopi).

Hvis der ved denne undersøgelse påvises kønsvorter, vil speciallægen orientere dig om hvilke behandlingsmuligheder, der foreligger.



Du bliver i den forbindelse informeret om operationens art, varighed og efterforløb samt om mulige bivirkninger og komplikationer ved indgrebet.

Hvis du derefter bestemmer dig for en operation, kan du være med til at planlægge tidspunktet for operationen.

Forventninger

Oftentimes vil det være nødvendigt med flere behandlinger.

HPV vaccination beskytter effektivt mod de fleste kønsvorter. Vaccinen virker dog bedst, hvis den gives inden seksuel debut.

HUSK! Din partner bør også undersøges af sin læge og evt. behandles samtidig med dig, så I ikke smitter hinanden.

Der anbefales jævnlige kontroller i en periode efter behandling af kønsvorter i endetarmsåbningen.

Forberedelse

Vi anbefaler, at du inden operationen har læst denne folder samt folderen "Generel vejledning i forbindelse med din operation".

Faste

Operationen foregår i fuld bedøvelse, og du skal møde fastende til operationen.

Pause med medicin

Se angående dette i folderen "Vanlig medicin i forbindelse med din operation".

Udrensning

Endetarmen skal være tom inden operationen. Du skal derfor i forvejen have købt et 120 ml. Klyx på apoteket, som du skal anvende om morgenen på operationsdagen. Følg vejledningen i pakken.

Dagkirurgi (ambulant)

Operationen bliver lavet som dagkirurgi, og du kan forvente at blive udskrevet få timer senere samme dag.

Operation

Operationen varer 1/2 - 1 time og foregår i fuld bedøvelse.

Under operationen bliver samtlige kønsvorter brændt væk vha. el-kirurgi. Dette gøres på en måde, så huden tager mindst mulig skade.

Der bliver lagt en forbindelse / indlæg i trusserne, når operationen er slut.

Efter operationen

Efter operationen taler du med speciallægen og sygeplejersken, som informerer om planen og evt. forholdsregler i tiden efter operationen.

Efter udskrivelsen

Smerter

Huden i endetarmsåbningen vil være øm den første uges tid. Du kan opleve svie i området. Smerter kan lindres med smertestillende håndkøbsmedicin.

Sår / bad

Det er helt normalt, at det bløder lidt fra sårene, som i løbet af få dage får skorpe. Du må brusebade allerede dagen efter operationen.

Området bør skylles efter hvert toiletbesøg og i øvrigt holdes rent og tørt.

Afføringsmiddel

Du bør sørge for ikke at have for hård afføring. Du kan evt. tage et afføringsmiddel 1 - 2 dage før operationen. Afføringsmiddel kan købes i håndkøb eller apotek.

Daglige gøremål

Aktiviteter kan genoptages efter velbefindende.

Sygemelding

Som regel kan du vende tilbage til arbejdet allerede næste dag.

Opfølgning / kontrol

Vi anbefaler jævnlige kontroller enten hos os eller hos din egen læge i en periode efter behandling af køns-vorter. Vi tilbyder en kontrol efter 1 - 3 måneder (evt. med undersøgelse af endetarmen).

Mulige bivirkninger og komplikationer

Der er generelt ingen risiko for bivirkninger eller komplikationer forbundet med fjernelse af kondylomer.

Betændelse

I sjældne tilfælde kan der opstå betændelse af huden omkring et sår. I disse tilfælde vil der være tiltagende rødme og ømhed af den omkringliggende hud. Hvis der opstår betændelse, skal såret tilses og renses. Ofte vil der blive startet antibiotikabehandling.

Arvæv

Ved udbredte forandringer kan der dannes generende arvæv. Dette er særligt tilfældet, hvis kondylomerne har været lokaliseret til urinrøret.

Tilbagefald

Tilbagefald kan forekomme, også selv om du ikke har været udsat for fornyet smitte.

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk

KJHA 20