


Trylleplaster inden dit barn skal bedøves


Når dit barn skal bedøves, lægger narkoselægen et drop i hånden med en tynd nål. Derfor er det vigtigt, at huden på barnets hånd er godt lokalbedøvet. Dette gøres med et plaster på hver hånd. I har derfor fået udleveret to plastre ved forundersøgelsen. På Aleris bruges plastre til børn til og med 15 år.

Plasterets midterste del indeholder en creme, kaldet EMLA eller "tryllecreme", som virker lokalbedøvende. En time efter påsætningen vil området under plasteret være næsten følelsesløst, og lægen kan stikke uden, eller med meget få smerter. Plasteret kan virke i op til 5 timer.

Plastre påsættes lige inden I tager hjemmefra. Så vil det komme til at passe tidsmæssigt. Det er vigtigt at I følger vejledningen her, så plasteret virker optimalt.



EMLA plastret åbnes ved at fjerne aluminiumsfolien ved metalfligen. Berør ikke den runde, hvide overflade



Anbring plastret på huden, så den hvide overflade dækker området, der skal bedøves. Ofte kan man se blodkarret som en mørkeblå aftegning på håndryggen tæt ved håndleddet. Plasteret skal dække dette område.



Hvis I ikke kan se blodkarret, sættes plasteret midt på håndryggen. Plasteret vendes som på billedet.

Pres omhyggeligt hele vejen rundt på plasters kant, så det fæstnes godt. Gnid forsigtigt på midten af plasset, så EMLA-cremen er i god kontakt med huden.