

Træningsprogram
efter operation af

Skulder-højdeled efter ledscred (AC-led)

Træningen består af et øvelsesprogram kombineret med daglige gøremål som bad, påklædning, rejse og sætte sig.

Generelt

- De første 4 uger skal du anvende en fikserende armslynge. Du skal bruge den både dag og nat
- Du må ikke løfte armen over vandret/skulderhøjde de første 6 uger
- For at optimere skulderens funktion, er det vigtigt at have en god holdning. Når man har smerte i skulderen, vil man ofte krumme sig lidt sammen, så tænk på at rette dig op – flere gange om dagen
- Du skal begynde at lave øvelser dagen efter operationen
- Du må ikke pine dig selv, når du træner, men specielt i begyndelse må du ofte acceptere en vis ømhed/ubehag i forbindelse med træningen
- Du må forvente at have smerter i skulderen efter operationen, og du skal derfor tage den smertestillende medicin, som du får anvist
- De første 3-4 dage kan du med fordel bruge nedkøling med is til at lindre smerte og reducere hævelse. Køl i max. 20 minutter hver anden vågne time

Øvelser

Formål med træningen

- Modvirke led- og muskelstivhed
- Dæmpe smerte
- Øge bevægeligheden

Øvelsesudvalg

- Træn bevægeøvelserne 4-5 gange dagligt i 5-10 minutter
- Skift mellem øvelserne og lav dem, der passer dig bedst
- Du skal lave 5-10 gentagelser af hver øvelse afhængig af sværhedsgraden
- I takt med at smerterne aftager, må du øge antallet af gentagelser fx til 2x20 gentagelser. Mærk altid efter

Du skal starte yderligere genoptræning hos en fysioterapeut indenfor 4-6 uger.

Genoptræningen varer typisk 3-4 måneder.

Stående øvelser



Øvelse 1

Stå med den raske arm støttet til et bord. Læn dig fremover og lad den opererede arm hænge frit.

- Lav cirkelbevægelser
- Lav svingbevægelser fra side til side
- Lav svingbevægelser frem og tilbage

Lav hver øvelse ca. 30 sek. Det er vigtigt, at du slapper så godt af i skulderen som muligt.


Siddende øvelser



Øvelse 2

Læg venstre øre ned mod skulderen. Hold strækket i 20-30 sek. Skift til højre side.


Siddende øvelser, fortsat



Øvelse 3

Sæt dig ved et bord i god højde. Læg den opererede arm på et håndklæde eller viskestykke, så den glider let.

Bevæg armen med hjælp af den ikke-opererede arm fra side til side, så langt du kan.



Øvelse 4

Bevæg armen lidt frem og tilbage. Hvis du har ondt, kan du hjælpe med den anden hånd.



Øvelse 5

Sid yderligt på en stol med fødderne placeret foran knæene og dine hænder på knæene. Lad dine hænder glide ned langs underbenet.

Liggende øvelser

Liggende øvelser skal udføres på fast underlag for at stabilisere skulderbladet i bevægelserne. Undgå derfor at lave øvelserne i sengen.



Øvelse 7

Lig på ryggen med den opererede arms hånd på din mave. Hold albuen ind til kroppen og brug din ikke opererede arm til at føre hånden/underarmen ud til siden. Hold stillingen i 5 sek.



Øvelse 8

Lig på ryggen med den opererede arms hånd på din mave. Brug din ikke-opererede arm til at føre albuen ud til siden. Hold stillingen i 5 sek.



Øvelse 9

Lig på ryggen. Tag fat om håndleddet på den opererede arm og løft armen til vandret ved hjælp af din ikke-opererede arm. Hold stillingen i 5 sek.

Gode råd

- Der er brug for stor tålmodighed fra din side, da der kan gå 2-3 måneder, inden smerterne er faldet til ro, og der kan gå mellem 1/2-1 år, inden generne er helt væk
- Du skal afpasse din træning / aktiviteter, så du ikke fremprovokerer hævelse og smerter. Du må gerne kunne mærke, at du laver øvelser, men eventuelle smerter skal fortage sig i løbet af 30 min. efter endt øvelsesprogram
- Køl evt. med is efter træning
- Motion og idræt kan genoptages, når smerter i skulderen er væk. Idræt uden voldsom skulderbelastning, som fx cykling og løb kan genoptages før skulderbelastende aktiviteter
- Gå daglige ture. Husk medsving af armene, når du går, så du får løsnet muskulaturen omkring skulder og nakke
- Brug gerne puder til at understøtte din arm, når du hviler både i liggende og siddende
- Vær opmærksom på din kropsholdning. Når man har ondt i skulderen, spænder man og skyder skulderen frem. Kontrollér foran et spejl, at dine skuldre sidder på rette plads

Aleris Hospitaler - Vest

Aalborg

Sofiendalsvej 97
DK - 9200 Aalborg SV
Tlf. +45 3637 2750
aalborg@aleris.dk

Esbjerg

Bavnehøjvej 2
DK - 6700 Esbjerg
Tlf. +45 3637 2700
esbjerg@aleris.dk

Aarhus

Brendstrupgårdsvej 21 A, 1. sal
DK - 8200 Aarhus N
Tlf. +45 3637 2500
aarhus@aleris.dk

Herning

Poulsgade 8, 2. sal
DK - 7400 Herning
Tlf. +45 3637 2600
herning@aleris.dk

Aleris Hospitaler - Øst

København

Gyngemose Parkvej 66
DK - 2860 Søborg
Tlf. +45 3817 0700
kobenhavn@aleris.dk

Ringsted

Haslevvej 13
DK - 4100 Ringsted
Tlf. +45 5761 0914
ringsted@aleris.dk

www.aleris.dk